



Permen® Med Forte

Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

INFORMATOR DLA PACJENTA

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania z *Informatorem dla pacjenta*. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w *Kwestionariuszu dla pacjenta*.

Lek Permen Med Forte, 50 mg, tabletki powlekane zawiera sildenafil i jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Permen Med Forte pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Leku Permen Med Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

W jaki sposób dochodzi do wzwodu

Erekcja (wzwód prącia) jest złożonym procesem wymagającym współdziałania układu nerwowego, naczyniowego i hormonalnego. Ten proces nie może zajść bez odpowiedniej stymulacji seksualnej.

Ciała jamiste, z których zbudowany jest członek, w czasie pobudzenia seksualnego zostają silnie wypełnione krwią. Powstały w ten sposób wzrost ciśnienia krwi prowadzi do erekcji (wzwodu) – usztywnienia umożliwiającego odbycie stosunku płciowego. Wzwód jest możliwy do osiągnięcia tylko wtedy, gdy układ nerwowy i naczyniowy działają prawidłowo. Zapewnia to właściwe reagowanie na bodźce seksualne oraz doprowadzenie odpowiedniej ilości krwi do członka.

Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji (dawniej i/lub potocznie: impotencja) mają miejsce wtedy, gdy mężczyzna przez dłuższy czas nie jest w stanie uzyskać lub utrzymać wzwodu w taki

sposób, by odbyć satysfakcjonujący stosunek płciowy. Wynikają one ze zmniejszonego napływu krwi do ciał jamistych prącia.

Bardzo często zaburzenia erekcji są następstwem uszkodzenia naczyń doprowadzających krew do prącia.

Zaburzenia erekcji mogą być pierwszym zwiastunem chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym choroby niedokrwiennej serca, która może prowadzić do zawału. Otyłość, ograniczona aktywność fizyczna i nieprawidłowe nawyki żywieniowe oraz związana z nimi cukrzyca należą do najczęstszych przyczyn uszkodzenia naczyń krwionośnych.

Do pozostałych czynników ryzyka wystąpienia zaburzeń erekcji zalicza się: zaawansowany wiek, siedzący tryb życia, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, przyjmowanie niektórych leków, stosowanie używek (papierosy, alkohol), zaburzenia depresyjne.

Leczenie zaburzeń erekcji

Leczenie zaburzeń erekcji obejmuje następujące elementy:

- zmiana stylu życia, np. rezygnacja z palenia papierosów, zwiększenie aktywności fizycznej, redukcja masy ciała, zmiana diety,
- diagnoza i leczenie chorób, których przyczyną mogą być problemy z erekcją,
- dobranie leczenia innych chorób tak, aby nie przyczyniło się do występowania problemów z erekcją (np. w wyniku działań niepożądanych niektórych leków),
- stosowanie leków wpływających na poprawę erekcji.

KWESTIONARIUSZ DLA PACJENTA

Przed zastosowaniem leku Permen Med Forte (Sildenafilum) należy skorzystać z dołączonego narzędzia diagnostycznego i odpowiedzieć na poniższe pytania.

Czy jesteś mężczyzną w wieku 18 lat lub więcej

TAK

NIE

NIE POWINIEN PAN PRZYJMOWAĆ TEGO LEKU!

Czy odczuwa Pan potrzebę przyjęcia leku, który stosuje się w leczeniu zaburzeń wzrodu, czyli niemożności uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

TAK

NIE

NIE POWINIEN PAN PRZYJMOWAĆ TEGO LEKU!

Poniżej znajduje się 10 grup pytań. Odpowiedź na nie pomoże Panu dowiedzieć się, czy zastosowanie tego leku jest dla Pana bezpieczne. Jeśli odpowiedź na wszystkie pytania z grupy brzmi „NIE” proszę wpisać ją w kratce obok. W przypadku wątpliwości lub odpowiedzi „TAK” wystarczy zostawić puste miejsce

1. Czy przyjmuje Pan którykolwiek z poniżej wymienionych leków, stosowanych zwykle w leczeniu choroby niedokrwiennej serca, choroby wieńcowej, dławicy piersiowej, dusznicy bolesnej, „ból w klatce piersiowej”?

- nitroglicerynę inaczej gliceroli trinitras (np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit) • monoazotan izosorbidu (np. Effic, Effic long, Mono Mack Depot, Mononit, Mononit retard, Monosan, Olicard, Olicard retard) • molsidominę (np. Molsidomina WZF) • pentaerytryl (np. Galpent, Pentaerythritol compositum) • sakubitryl + walsartan np. Entresto, Neparvis

2. Czy stosuje Pan środki uwalniające tlenek azotu tzw. „poppers”, wdychane np. w celu zwiększenia doznań seksualnych?

3. Czy stosuje Pan leki alfa-adrenolityczne używane do łagodzenia objawów rozrostu gruczołu krokowego (prostaty, stercza) i/lub w nadciśnieniu tętniczym?

- doksazosynę (np. Adadox, Apo-Doxan, Cardura, Doxagen, Doxanorm, Doxar, Doxazosin, Doxonex, Doxorion, Dozox, Kamiren, Zoxon) • terazosynę (np. Hytrin, Kornam, Setegis) • alfuzosynę (np. Alfabax, Alfurion, Aftuzostad, Alugen, Dalfaz) • sylodosynę (np. Pirseo, Sidarso, Silodosin, Silodyx, Urorec) • tamsulosynę (np. Adatam, Apo-Tamis, Bazetham, Duitam, Duodart, Duotix, Dutamsol, Dutaprostam, Dutasteride Tamsulosin, Dutatev, Dutrozen, Fintarts Duo, Fokusin, Landulosin, Marumax, OMI-TAM, Omnic, Omsal, Prostammic, Ranlosin, Suprostit, Symlosin, Tadumix, Tamduro, Tamiron, TamisPRAS, Tamoptim, Tamsiger, Tamsudil, Tamsugen, Tamsulosin, Twipros, Tanyz, Unisol, Uprox, Urostat, Vesomni)

4. Czy przyjmuje Pan obecnie leki przeciwbakteryjne (antybiotyki) wymienione poniżej?

- erytromycynę (np. Davercin, Erythromycinum TZF) • klarytromycynę (np. Apiclar, Clarithromycin, Fromilid, Klabax, Klabion, Klabolic, Klacid, Klarmin, Lekoklar, Taclar) • cyprofloksacynę (np. Ciphin, Ciprinol, Ciprofloxacyn, Cipronex, Cipropol, Proxacin)

5. Czy stosuje Pan obecnie którykolwiek z poniżej wymienionych leków?

- itrakonazol (np. Ipozumax, Itraconazole, ItraGen, Itrax, Itrokast, Itromyx, Orungal, Trioxal) - lek przeciwgrzybiczy • ketokonazol (np. Ketoconazole HRA) - w postaci tabletek, stosowany w leczeniu zespołu Cushinga (nadmiernego wytwarzania kortyzolu w organizmie)

6. Czy zdarza się, że występuje u Pana choćby jeden z poniżej wymienionych objawów, które mogą wskazywać na choroby serca i naczyń krwionośnych?

- ból, pieczenie w klatce piersiowej po wysiłku, np. w czasie stosunku płciowego • duszność, brak tchu w czasie spaceru, wchodzenia po schodach, aktywności fizycznej • kołatanie serca, szybkie bicie serca, nierówne bicie serca • zawroty głowy, omdlenie, utrata przytomności • niskie (90/50 mmHg) lub wysokie (160/90 mmHg) ciśnienie tętnicze

7. Czy przyjmuje Pan obecnie jakiegokolwiek lek z powodu leczenia:

- nadciśnienia płucnego, np. riociguat (Adempas) • zaburzeń erekcji • zakażenia HIV • zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby

8. Czy choruje/leczy się Pan obecnie z powodu choćby jednej z poniżej wymienionych chorób:

- szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego) • chorób krwi (białaczkę, zaburzeń krzepnięcia) • choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy • ciężkich zaburzeń czynności wątroby (np. z powodu marskości wątroby) i/lub nerek

9. Czy występuje u Pana choćby jeden z poniżej wymienionych stanów:

- okres do 6 miesięcy po zawału serca lub udarze mózgu • zniekształcenie, skrzywienie prącia, stwardnienie prącia (jako choroba Peyroniego) • utrata lub osłabienie wzroku w jednym oku z innej przyczyny niż jaskra, zaćma lub uraz • uczulenia na leki, w tym np. w przeszłości na leki w leczeniu zaburzeń erekcji

10. Czy rozpoznano u Pana którąkolwiek z poniżej wymienionych chorób dziedzicznych?

- niedokrwistość sierpowato krwinkowa (choroba krwi) • zwrodnienie barwnikowe siatkówki (choroba oczu) • hemofilia (choroba krwi z ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi)

Jeśli wpisał Pan 10x „NIE”, po zapoznaniu się z ulotką dołączoną do opakowania, może Pan przyjąć lek Permen Med Forte.

Zaleca się, aby w ciągu 6 miesięcy od pierwszego zastosowania leku zgłosił się Pan do lekarza, który może zdiagnozować przyczyny występujących zaburzeń erekcji i zalecić również inne leczenie.

Jeśli choćby pozostało JEDNO wolne miejsce w kratce obok pytania,

NIE POWINIEN PAN PRZYJMOWAĆ TEGO LEKU bez konsultacji z lekarzem.

Tylko lekarz może właściwie ocenić u Pana bezpieczeństwo stosowania tego leku.

Jeśli na wszystkie pytania pacjent udzielił odpowiedzi „NIE” należy odpowiedzieć na pytania poniżej, aby dokonać wyboru odpowiedniej dawki leku.

NIE lub
NIE WIEM

Czy pacjent stosował już lek z sildenafilem?

TAK

Pacjent może przyjąć dawkę leku zawierającego 25 mg sildenafilu

Przejdź dalej, aby wybrać odpowiednią dawkę

25 mg

Przejdź dalej, aby wybrać odpowiednią dawkę

Jaką dawkę leku zawierającego sildenafil przyjmował pacjent?

50 mg lub wyższą

Pacjent może przyjąć dawkę leku zawierającego 50 mg sildenafilu

Czy dawka 25 mg przyniosła pożądany efekt?

TAK

NIE

Pacjent może przyjąć dawkę leku zawierającego 25 mg sildenafilu

Pacjent może przyjąć dawkę leku zawierającego 50 mg sildenafilu

Jeśli nadal nie jest Pan pewien, czy może zastosować lek Permen Med Forte lub ma Pan problem z wyborem dawki, przez użyciem leku może Pan skonsultować się z farmaceutą.

W 82282/I-P/01/PL

W A L M A R K®

Dispatch note of print out packing material

W A L M A R K®

Pharma code: ----

Design / Year:

2021 DTP operator / Studio:

David Kněžek / internal

Proof numb. / Date 1. proof:

3 / 20.04.2023

Used printing material:

80 60 g Special printing technology:

Used Colours: 1

Cut Size (mm):

240 x 450 mm

B L A C K